



F.A.I.A.M.

Fundación Miastenia Gravis
en Argentina desde 1988

DROGAS QUE DEBEN SER EVITADAS O, EN CASO DE NECESIDAD, SER ADMINISTRADAS BAJO ESTRICTO CONTROL MÉDICO EN PACIENTES QUE PADECEN MIASTENIA GRAVIS (MG).

IMPORTANTE: Dada la cantidad de drogas disponibles en el mercado aconsejamos SIEMPRE consultar a su médico especialista en MG antes de comenzar un tratamiento especial.

1. Relajantes Musculares

Menores: Benzodiazepinas
Meprobamato
Baclofen
Dantrolene

Mayores: Pancuronio
Succinilcolina
Clorpromazina

Antimoniacos: Litio

2. ATB y Similares

La exacerban (contraindicados)

a) Amino glucósidos:

- Estreptomina
- Kanamicina
- Neomicina. Gentamicina. Lincomicina
- Amikacina. Tobramicina
- Paramomicina. Sisomicina
- Viomicina. Spectinomicina

b) Macrólidos:

- Telitromicina
- Azitromicina

c) Quinolonas:

- Ciprofloxacina
- Norfloxacina
- Levofloxacina

d) Betalactámicos:

- Imipenem

e) Fosfonatos:

- Fosfomicina

f) Polipéptidos:

- Colisitina. Polimixinas
- Bacitracina

g) Tetraciclinas.

h) Aminoácidos Monobásicos:

- Lincomicina
- Clindamicina

Contraindicación relativa (ya que es dudosa su interaccion)

- Ampicilina y Eritromicida (bloquea placa motora, pero sin evidencia clínica)
- Sulfamidas (bloquea, pero sin evidencia clínica)

3. Farmacos Cardiovasculares

La exacerban (contraindicados)

- Quinidina
- Procainamida. Lidocaína
- Betabloqueantes (Propanolol, Oxoprenolol, Timolol, Pindolol, Sotalol, Practolol)
- Sulfato de Magnesio
- Reserpina

Contraindicación Relativa Cardiologicas

- Antagonista del Calcio (no hay evidencia clínica desde hace mas de 25 años trabajando con pacientes con MG)

4. Anticonvulsivantes (contraindicados)

- Hidantoínas (fenitoína)
- Barbitúricos
- Benzodiazepínicos
- Etosuximida

5. Psicótrópicos (Se debe ser precavidos con los tranquilizantes)

- Benzodiacepinas
- Carbonato de Litio

- Antidepresivos:
 - Triciclicos: Amitriptilina
Imipramina
Inhibidores de la MOA

- Neurolépticos:
 - Fenotiacina
Clorpromacina
Butirofenonas
Holaperidol

6. Antihistamínicos

- Difenhidramina (benadryl)

7. Hipnóticos

- Barbitúricos
- Benzodiacepínicos

8. Analgécicos

- Morfina
- Dipirona Magnésica (novalgina)
- Hioscina (buscapina)
- Hioscina + Dipirona (buscapina compuesta)

9. Antirreumaticos

- D Penicilina
- Cloroquina
- Colchicina

10. Hormonas

- ACTH y Corticoides (solo usarlo bajo indicación medica)
- Hormona Tiroidea, Occitocina, Anticonceptivos

11. Anestésicos

- Anestésicos Generales
- Eter y Cloroformo
- Ketamina (NO)
- Metoxifluorare
-

Usar con precaución LIDOCAINA bajo control médico.

12. Diureticos

- Evitar aquellos que pierden POTASIO por orina, pueden usarse los que lo retienen, (ahorradores de potasio)

13. Laxantes y Enemas

- Pueden expoliar POTASIO
- Evitar preparados con MAGNESIO

14. AGUA TONICA (quinina)

Se advierte que ante una prescripción médica, sea de un oftalmólogo, dentista, psicólogo o médico clínico, la persona con MG igualmente debe consultar con su médico especialista en Miastenia Gravis o llamar a FAIAM Fundación Miastenia Gravis, (+54) 11-4827-9107, exclusivamente desde el interior del país 0-810-444-7989, por e-mail a faiam@faiam.org.ar para su autorización.

IMPORTANTE: LAS PERSONAS CON MG - NO DEBEN DONAR SANGRE NI ORGANOS.